

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 1-9-65 409030

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement Annuel
15 F, 00

- Supplément N° 1 au Bulletin n° 59

1965 - 24

- A V E R T I S S E M E N T S -

V I G N E

- VERS DE LA GRAPPE :

Dans quelques vignobles (base des Côteaux du Gaillacois, Frontonnais, en particulier) le troisième vol d'Eudémis est commencé depuis un certain temps et des oeufs ont déjà été déposés. Les premières éclosions de jeunes chenilles vont se produire incessamment dans les secteurs très précoces, tel celui de St Cécile près de Gaillac, tandis qu'elles débiteront un peu plus tard dans le Frontonnais.

La troisième génération semble devoir être importante.

En conséquence, un traitement à l'aide d'un produit de type préventif pourrait être appliqué dès réception dans les situations précoces; seulement vers le milieu de la semaine du 30 Août au 5 Septembre dans le Frontonnais.

Ailleurs, attendre les indications qui seront données dans le prochain bulletin.

Si l'on préfère employer un produit de type curatif, retarder l'application de 6 à 7 jours.

Nous rappelons que les blessures causées aux grains par les "Vers de la grappe" favorisent l'installation de la Pourriture grise.

ARBRES FRUITIERS

- TORDEUSE ORIENTALE - (Protection des fruits à pépins).

Uniquement dans les vergers situés dans des lieux particulièrement sensibles aux attaques de Tordeuse orientale (voisinage immédiat de Pêchers, de Stations de Conditionnement) il semble utile de renouveler la protection.

Veiller à bien respecter la législation sur les limites d'emploi des produits.

- I N F O R M A T I O N S -

CULTURES LEGUMIERES

- Melon -

L'Oïdium se manifeste dans de nombreuses cultures et l'envahissement de celles-ci s'effectue rapidement. En outre, à la suite des pluies fraîches tombées à la fin Juillet et en Août, la Cladosporiose a fait son apparition, notamment dans

F. 73

les cultures mal protégées.

Dans les plantations tardives dans lesquelles la récolte va se poursuivre encore un certain temps et surtout dans celles où la cueillette n'est pas commencée, il y a lieu de poursuivre la protection du feuillage et des fruits en appliquant un traitement mixte à base de Manèbe et d'un produit anti-oïdium.

TOULOUSE, le 27 AOUT 1965

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi
Le Directeur - Gérant : L. BOUYX